

AMCoR

Asahikawa Medical University Repository <http://amcor.asahikawa-med.ac.jp/>

看護研究集録(2013.03) 平成23年度:60-63.

外来点滴センターにおけるレミケード投与患者の看護の実際

佐々木美穂

H23.9.6 旭川ナースセミナー

外来点滴センターにおける レミケード投与患者の看護の実際

旭川医科大学病院
腫瘍センター 佐々木美穂

旭川大学病院 外来点滴センターの紹介

□ ベット 9床 リクライニングチェア3床

□ スタッフ

★ 医師 (on call制)

★ 薬剤師 1人

★ 看護師 4人

★ 受付 1人

□ 月～金

8:30～17:15



全体の風景




電動ベッド5床



ストレッチャータイプベッド
4床



リクライニングチェア3床



安全キャビネットとクリーンベンチ

点滴センターの目的

- 外来点滴スペースの確保と
快適な治療環境の提供
- 患者への安全な治療の実践と
医療事故防止
- がん化学療法の標準化と
業務の効率化

外来化学療法加算

2008年4月から1日につき

15歳以上では500点

- ・ 専用の病床を有する治療室
- ・ 化学療法の経験を有する専任の看護師
- ・ 専任の薬剤師が勤務
- ・ 急変時等の緊急時に対応できる体制の整備
- ・ 化学療法登録委員会の設置


* 関節リウマチおよびクローン病、パーチェット、尋常性乾癬に対するインフリキシマブも算定可能

点滴センターにおけるレミケード治療の内訳 2011年7月現在


- クローン病 75名
 - 関節リウマチ25名（うち7名はアクテムラ）
 - ベーチェット病 2名
 - 尋常性乾癬（皮膚科） 2名
- 計 104名




点滴センターで治療をした 関節リウマチ患者の状況



稼働件数（2011年1月～7月）



レミケード投与の実際



朝のミーティング



初回レミケードのチェック

| レミケード投与前チェックシート | |
|-----------------|---|
| 氏名 | 性別 |
| 性別 | 男性 / 女性 |
| 年齢 | 歳 |
| 病名 | 関節リウマチ / クローン病 / ベーチェット病 / 尋常性乾癬 |
| 投与前 | <input type="checkbox"/> 体温測定 <input type="checkbox"/> 脈拍測定 <input type="checkbox"/> 血圧測定 <input type="checkbox"/> 呼吸器聴診 <input type="checkbox"/> 心臓聴診 <input type="checkbox"/> 腹部触診 <input type="checkbox"/> 下肢浮腫の有無確認 <input type="checkbox"/> 皮膚病変の有無確認 <input type="checkbox"/> 薬剤アレルギーの有無確認 <input type="checkbox"/> 妊娠の有無確認 <input type="checkbox"/> 肝機能検査値の確認 <input type="checkbox"/> 腎機能検査値の確認 <input type="checkbox"/> 血液検査値の確認 <input type="checkbox"/> 薬剤相互作用の確認 <input type="checkbox"/> 患者の理解と同意の確認 <input type="checkbox"/> 緊急時の連絡体制の確認 <input type="checkbox"/> その他 |
| 投与後 | <input type="checkbox"/> 体温測定 <input type="checkbox"/> 脈拍測定 <input type="checkbox"/> 血圧測定 <input type="checkbox"/> 呼吸器聴診 <input type="checkbox"/> 心臓聴診 <input type="checkbox"/> 腹部触診 <input type="checkbox"/> 下肢浮腫の有無確認 <input type="checkbox"/> 皮膚病変の有無確認 <input type="checkbox"/> 薬剤アレルギーの有無確認 <input type="checkbox"/> 妊娠の有無確認 <input type="checkbox"/> 肝機能検査値の確認 <input type="checkbox"/> 腎機能検査値の確認 <input type="checkbox"/> 血液検査値の確認 <input type="checkbox"/> 薬剤相互作用の確認 <input type="checkbox"/> 患者の理解と同意の確認 <input type="checkbox"/> 緊急時の連絡体制の確認 <input type="checkbox"/> その他 |



投与前にすること

【初回】

- 体重の確認、ツ反の結果、X線
- リスクの確認
(結核、肺疾患、喘息、アレルギー歴、糖尿病、65歳以上、PSL6mg以上)

※最近の体調、上気道感染の有無

※前回治療後の投与時反応の有無

※バイタルサイン

クリーンベンチでの調剤



重量監査の実際



ミキシングが終了した薬剤
レミケード350mg

重量をカウントする
23.66 g

換算表

| レミケード | |
|---------|--------|
| 100 mg | |
| 生食 10mL | |
| 用量 (mg) | 重量 (g) |
| 10 | 28.5 |
| 20 | 27.4 |
| 30 | 26.3 |
| 40 | 25.3 |
| 50 | 24.2 |
| 60 | 23.1 |



完成!

±0.6誤差範囲

患者照合 リストバンド



投与時は 2人でダブルチェック!

